



## Hasznos javaslatok

### Legyen tájékozott

Egy napon kedvence műtétre szorulhat betegség, vagy sérülés miatt. Ismerje meg azokat a műtéttel kapcsolatos alapvető tennivalókat, amelyek megkönnyítik az amúgy is problémás időszakot áthidalni a lehető legkevesebb komplikációval, az állat minél előbbi gyógyulása érdekében.

A műtéti beavatkozás jellegétől függően az állatorvos speciális utasításokkal is el fogja látni.



### Műtét előtti tennivalók

- A műtétet megelőzően elvégzett, átfogó felülvizsgálat eredménye alapján dönt az állatorvos arról, hogy az állat állapota lehetővé teszi-e a beavatkozást.
- Ellenőrizze, hogy az állat az összes oltását megkapta, teljeskörű-e a védettsége.
- Előfordulhat, hogy az állatorvos vérvizsgálatot ír elő annak érdekében, hogy a csak klinikai vizsgálatokkal nem diagnosztizálható betegségekre is fény derüljön. A műtétet megelőző néhány napban sor kerülhet egy antibiotikum kúrára is, amely nagyobb esélyt biztosít a műtét utáni sikeres felgyógyulásra.
- A műtét előtt nem szabad az állatnak enni és inni adni, a megvonás időtartamát az állatorvos szabja meg.



### Műtét utáni tennivalók

- Az állat a műtét után gyenge lesz. Biztosítsunk számára nyugalmat, hogy semmi se izgassa fel.
- A kórház elhagyásakor ne engedje szabadon futkározni az állatot, tartsa pórázon, vigye ölben, vagy tolja egy kiskocsiban. Ezzel újabb sérülést előzhetünk meg.
- Otthon olyan helyre helyezze míg ébrednek, ahonnan nem tud leesni, ezzel szintén újabb sérülésektől óvjuk az állatot.
- Az állat fekhelye legyen tiszta, meleg és száraz.
- Csak teljes ébredését esetében kaphat újra enni vagy inni.
- Ha az állatorvos speciális diétát írt elő a műtét utáni időszakra, kövesse az utasítását.
- Kímélje meg kedvencét az erőfeszítésektől, az állat ne erőltesse meg magát lépcsómászással, ugrálással vagy futással, nehogy a varratok felszakadjanak.
- Műtét után szükség lehet gyógyszeres kezelésre is, az alkalmazásnál kövesse a használati utasítást.
- Ne engedjük, hogy az állat a műtéti sebet nyalogassa, rágja. Ennek megakadályozására jól bevált a nyakgallér alkalmazása.
- Varratszedésre általában 10 nap múlva kerül sor, addig is, a műtét után naponta ellenőrizze a sebet, hogy nincs-e kipirulva, beduzzadva, vagy hogy nem váladékozik-e. Ha a seb állapota aggodalomra ad okot azonnal kérje állatorvosa tanácsát.

ÁLLATORVOSI KLINIKA BÉLYEGZŐJE

### Jegyzet
